

	名稱、劑量	特徵	作用	副作用	護理方向
第一代抗精神病藥	Sulpiride 200mg 舒神寧膜衣錠 	圓 (白) 一面 HC/6201 一面光滑	典型多巴胺拮抗劑，緩解精神病症狀，對鬱病及精神分裂症併有憂鬱狀態者有效。低劑量用於治療胃潰瘍、十二指腸潰瘍。	1. 初次易有錐體外徑路症候群。 2. 泌乳激素增高、體重增加、口乾、便秘、暈眩、姿勢性低血壓、噁心、嘔吐、鎮靜、嗜睡、排尿困難、心跳緩慢、心律不整。	1. 心血管系統- (1) HR ↑：深呼吸，適度休息和運動、避免抽煙、喝咖啡或含咖啡因的食物飲料。 (2) 姿勢性低血壓：漸進式下床、注意褲管長度避免跌倒。
	HALOPERIDOL L 商品名： Binison 5mg 和樂得錠 	草綠色圓形錠劑，一面有一刻痕，	高效價抗精神病藥物，改善幻聽、幻視、妄想、思考鬆散、激動、焦慮不安、失眠等精神症狀。	EPS 的發生率較高-不自主的改變姿勢、焦躁不安、靜坐困難、肌肉張力失調口乾、便秘、視覺模糊、暈眩、姿勢性低血壓	2. 腸胃道系統- (1) 噁心嘔吐：喝溫開水、服藥後 30 分鐘內不要立即躺下。 (2) 腹瀉：避免喝牛奶、注意電解質的補充。 (3) 流口水：枕頭可用毛巾、塑膠袋墊著，睡覺時側睡。 (4) 口乾：少量多次喝開水、口含小冰塊酸梅、嚼無糖口香糖、漱口、使用護唇膏保持嘴唇濕潤、做好口腔衛生避免蛀牙、牙周病。
	Rosup 25mg 	綠色膠囊	典型的多巴胺拮抗劑，可緩解精神病的正性症狀	EPS 的發生率較高-不自主的改變姿勢、焦躁不安靜坐困難、肌肉張力失調鎮靜	(5) 便秘：多食高纖食物、開水、按摩下腹部、多活動；予預防性軟便劑。
第二代抗精神病藥物	Clozaril 可治律 	25mg- 圓 (黃色) 一邊 L/O、 一邊 SANOOZ 100mg- 圓 (黃色) 一邊 Z/A、 一邊 SANOOZ	1. 用在對其他精神科藥物無效。 2. 改善正、負性精神症狀如：幻覺、妄想、混亂行為與言行、活動力減少、情感淡漠、退縮、思考障礙。	1. 白血球減少或顆粒性白血球缺乏症。 2. 頭暈、頭痛、思睡、姿勢性低血壓、便秘、體重增加、口乾、心跳過快、流口水、疲倦。 3. 部分會有癲癇發作、視力模糊、體溫上升。 禁忌：對本藥成份過敏者、狹角性青光眼、顆粒性白血球減少或缺乏之患者、骨髓功能受損、癲癇、嚴重腎臟或心臟疾患	3. 中樞神經系統- (1) 疲倦嗜睡：一天中盡量利用時間作短暫休息時避免危險動作、操或開車、紀錄睡眠時數、白天鼓勵活動，與醫師討論調整給藥或改換比較不影響白天活動的藥物。 (2) 頭痛頭暈：保持愉快心情、適當運動及規
	Clopine 克慮平 	圓 (黃色) 一邊 swiss 一邊 Z/E			

第二 代 抗 精 神 病 藥 物	Apa-Risdol 理思得膜衣錠   	1mg -長橢圓形 (白色) 一側 Ris/1 一側 W. WIN 字樣 2mg -長橢圓形 (淡橘) Ris/2 3mg -長橢圓形 (黃色) 一側 Ris/3 一側 W. WIN 字樣	改善精神疾病正負向症	1. 常見-失眠、焦慮、頭痛、精神激動、便秘、視力模糊、嗜睡、眩暈。 2. 少數-EPS、泌乳素增加、姿勢性低血壓、HR↑。 禁忌：對本藥過敏者	律生活、定期量血壓、緩慢改變姿勢。減少疲勞、壓力、緊張的發生。 (3)EPS：減少咖啡因攝取，改善手抖；予預防性給藥。 (4)失眠：適度運動、下午四點後避免刺激性食物、養成規律的睡眠習慣、睡前避免過度進食。 4. 內分泌系統- (1)體重增加：控制飲食、規律運動、定期量體重。 (2)男性女乳、月經不規則：停藥後即恢復正常，予心理支持、與醫師討論改藥或併用其他藥物減輕副作用。
	Seroquel 思樂康模   	25mg -小圓形、粉橘色、一面印有藥名 200mg -圓形、白色 SEROQUEL 200 字樣 300mg -米白色、長橢圓形、XR300字樣	改善精神症狀 (正性負性)、如幻覺、妄想、混亂行為、胡言亂語、活動力減少、情感淡漠、退縮	疲倦、想睡、失眠、頭暈、頭痛、便秘姿位性低血壓、體重增加、口乾 禁忌：對本藥成份過敏者、嚴重肝臟疾患	5. 自主神經系統- (1)視力模糊：閱讀時可用放大鏡、注意安全 (2)排尿困難：適時誘尿 (溫水刺激、聽流水聲)、評估膀胱脹滿情形。 (3)性功能障礙：予心理支持、與醫師討論是否調藥。 6. 過敏反應- (1)白血球缺乏症：減少

第二 代 抗 精 神 病 藥 物	Lodopin 50mg 絡篤平 	小圓 (光滑白) 田/651	改善各種正、負性精神症狀， 正性(思考混亂、幻覺、妄想、多疑、敵意) 負性(情緒與社交畏縮、缺乏言談)	1. 無力、倦怠、失眠、口渴、暈眩、食慾不好、便秘。 2. 姿勢性低血壓、體重增加、流口水、便秘、月經不規則。 3. 錐體外徑路症候群。 4. 心室心律不整。 禁忌：對本藥過敏病史者	擁擠的戶外運動、勿接觸有毒物質(消毒劑、殺蟲劑)使用軟毛牙刷、保持口腔衛生、定期抽血測CBC。 (2) 皮膚疹子：外出時做好防曬(撐傘、戴帽)、情況嚴重時與醫師討論是否換藥並至皮膚科就醫。 (3) 皮膚乾燥搔癢：洗澡水水溫勿太高、使用清水或中性肥皂、塗抹乳液、外出時穿防曬或擋風的衣服。 (4) 黃膽：皮膚、眼球變黃時，馬上停藥就醫。
	Apa-Risdal 2mg 里斯得 膜 	長橢圓形 (淡橘) Ris/2	改善精神疾病正負向症狀。	1. 常見-失眠、焦慮、頭痛、精神激動、便秘、視力模糊、嗜睡、眩暈。 2. 少數-EPS、泌乳素增加、姿勢性低血壓、HR↑。 禁忌：對本藥過敏病史者	
	RISDONE 2mg 雷司動 錠 	長橢圓形 剝半痕， R2, R2, SINTONG			
抗 憂 鬱 抗 狂 躁 劑	Mesyrel 50mg 美舒鬱 	圓(淡粉 紅色) 一邊切線 一邊LO字	治療憂鬱症，改善憂鬱、情緒激動或不安、也可用於睡前幫助睡眠	噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、疲倦、失眠、口乾、便秘、眩暈、視覺模糊	
	Ligilin 300mg 鋰齊寧膠囊 	粉紅膠囊	治療躁病、預防躁鬱症藥物、也可使用於抗憂鬱劑治療憂鬱症時，加強抗鬱效果的輔助治療劑	手抖、口渴、口乾、尿量增、噁心、腸胃不適、稀便、疲倦、體重增加 藥物中毒徵兆-嗜睡、神志混亂、記憶力變差、譫妄、抽搐、昏迷、肌肉無力 禁忌：12歲以下兒童、嚴重腎臟疾病、飲食嚴重欠缺鹽分、急性心肌梗塞、癲癇、重症肌無力、懷孕前12周、餵母乳之婦女	

帕 金 森 氏 症 治 療 劑	Biperiden 2mg 匹力當錠 商品名: PEDEN RETARD Akinfree	圓 (白)一 面 KV1, 一邊切 線	預防及治療帕金森氏症與 因藥物引起之錐體外徑路 症候群副作用。	視覺模糊、口乾、暈眩、 排尿困難、便秘、腸胃不 適
	Bipiden 2mg 百必定錠 	圓 (白) B35/dp		
抗 癲 癇 藥 物	Depakine 帝拔顛  	200mg -圓 形、白色 500mg -大 橢圓形白 色、一面有 一刻痕,	主要抑制大腦放電傳導,治 療小發作癲癇,亦有降低焦 慮不安使情緒穩定作用。	頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、 疲倦、便秘或拉肚子
抗 焦 慮 劑	Erispan 0.25mg 癒利舒盼錠 	小圓白色 017 字樣	改善不安、焦慮、緊張、抑 鬱與自律神經失調,以及半 身麻醉時使用	口渴、食慾不振、腹部不 適、便秘或腹瀉

乙型阻斷劑	Inderal 10mg 恩特來錠 	小圓 (紫紅色)	治療高血壓、心絞痛、心肌梗塞、心律不整，在精神科用於治療因服抗精神病藥物所引起的坐立難安、焦躁、原地踏步或顫抖。	低血壓、心跳過慢、四肢冰冷、氣喘、呼吸困難、胃腸不適、暈眩、頭重腳輕、倦怠、睡眠不佳、眼睛、皮膚乾燥、皮膚過敏。 禁忌：支氣管痙攣、氣喘、阻塞性肺疾病、心跳過慢、心臟阻斷、心衰竭、懷孕及授乳婦女	
緩瀉劑	Through 20mg 便通樂 	小圓 (土黃色) 一面切線	緩解急性便秘。	噁心、腹痛、腹部不快感、皮膚發疹搔癢。	
制酸劑	Magnesium Oxide 250mg 氧化鎂錠 	圓 (白) SK/MGO	與胃酸作用後產生氯化鎂，有下瀉作用。少量制酸，多量輕瀉。	軟便。 禁忌：腹痛、嚴重腎功能不良、腸阻塞或穿孔、直腸出血	
鎮靜催眠劑	ESTAZOLAM ESZO 艾斯樂 (信東) 	錠/1, 2mg	本藥為 benzodiazepine 類的安眠藥，可抑制 GABA 受體，而產生鎮靜、安眠、骨骼肌鬆弛的作用，對於神經性、精神性和器官性等病因引起的失眠療效頗佳，本藥會縮短第三及第四期(緩慢腦波睡眠)及 REM 睡眠，增加第二期睡眠，因此可延長總睡眠時間。 本藥可以用來治療失眠，於睡覺前 1 次口服 1~4mg。	昏睡、頭痛、胃部不適、便秘、口乾、嘔吐、躁動、坐立不安等	交互作用： 1. 本藥品與抑鬱劑，MAO Inhibitor 或催眠、鎮靜劑、Phenothiazine 衍生物等中樞神經抑制劑會混合使用，有增強效力的作用 2. 本藥品在飲酒後服用也有藥力增強的作用，因此在這兩種情況下服用，要特別小心謹慎。

<p>Amisulpride 商品名:Ribelite</p> 	<p>200mg/tablet 圓形錠劑, 一面有一刻痕, 另一面為 RIBELITE 200 字樣</p>	<p>急慢性思覺失調症</p>	<p>失眠、焦慮、焦躁不安、錐體外症狀、</p>	
<p>Duloxetine 商品名:Cymbalta</p>	<p>30MG</p>	<p>重鬱症、糖尿病週邊神經痛、廣泛性焦慮症。</p>	<p>噁心、口乾、嗜睡、便秘、食慾降低、多汗。</p>	

<p>TRIHEXYPHE NIDYL HCL 商品 名:Switane</p> 	<p>2mg</p>	<p>帕金森氏症候群</p>	<p>1. 常見副作用：噁心（30%至50%）、口乾（30%至50%）、頭暈（30%至50%）、視力模糊（30%至50%）、精神緊張（30%至50%）。</p> <p>2. 其它副作用：嗜睡、胃部不適、嘔吐、腹瀉、便秘、眼睛對光線敏感、頭痛、神經質、尿困難等。</p> <p>3. 較嚴重副作用：失眠、皮膚起紅疹、行動笨拙、呼吸困難、迷幻、眼睛痛、精神恍惚。</p>	<p>禁忌： 青光眼（尤其是閉角性青光眼）、重症肌無力、心臟缺氧、休克、遲發性運動困難之患者。</p> <p>注意事項： 1. 此藥可能會造成思睡或頭暈目眩，開車或操作危險機器要注意。 2. 此藥會使眼睛對陽光更為敏感。 3. 此藥會降低身體正常的排汗及散熱的能力。 4. 兒童對本類藥品較敏感，可能增加副作用發生的機會。 5. 老年人對本藥較敏感，可能增加副作用（如激動、意識混淆、失去方向感、幻覺、記憶力喪失、男性排尿困難或疼痛）的機會。 6. 下列患者應謹慎使用： 腸阻塞、狹窄性消化道潰瘍、前列腺肥大、腎臟病、肝臟病、心律不整及心跳過快者。 7. 血管硬化症者服用本品易產生精神不安等副作用。 8. 若飯前服用引起噁心，可改為飯後服用。口乾時可用薄荷糖、口香糖或少量多次喝水來解除。</p>
--	------------	----------------	---	---

<p>LORAZEPAM 商品名: Silence Ativan</p>	<p>0.5mg 用法用量: 平均每日劑量 2-4mg 分次使用 1. 焦慮： 初劑量每日需 1~3mg 可分 2~3 次給予。 2. 失眠： 就寢前一次給予全日劑量 2~4mg。 3. 老年人或身體衰弱的患者： 初劑量每日 1~2mg 分次服用。 4. 手術前的藥療法： 手術前夜或手術一、二小時給予 2~4mg。</p>	<p>焦慮失眠</p>	<p>1. 常見副作用：思睡、眩暈、虛弱及情緒不穩。 2. 其它副作用：定向力障礙、憂鬱、噁心、胃口改變、頭痛、睡眠障礙、激動、皮膚方面的症狀、視覺障礙、各種胃腸症狀及以自律神經系表徵。</p>	<p>注意事項: 1. 白天倦睡，通常 2~3 天會消失，但必要時依照個別需要，調整劑量，可以減少此現象。 2. 患者曾使用抗焦慮劑，可以較高劑量開始。 3. 如果失眠是主要的症狀，睡前的劑量可以增加。 4. 手術前給藥，於手術前夜或手術前可給予 2~4mg，服藥與手術間之時間由醫師決定。 5. 本品與 Neuroleptics 藥物合併使用時，後者可以減量。 6. 靜脈注射本品超過建議劑量時，或使用本藥於年老人、重症患者或肺臟阻塞性患者時，可能導致換氣不足或缺氧性心跳停止，必需事先備好呼吸輔助的急救裝置。</p>
---	--	-------------	--	---