

## 林新 11A 急救用藥

藥物名稱	主要作用	副作用與注意事項	劑型與劑量
<b>Adenocor (Adenosine)</b>	強心劑、減慢房室結傳導速率、治療陣發性上心室心博過速	呼吸困難、噁心、頭暈、面部潮紅、心悸、不安	6mg/2ml Amp
<b>Amiodarone</b>	抗心律不整劑	熱潮紅、盜汗、噁心、掉頭髮。 引起中度和短暫性之血壓降低。	150mg/3ml Amp
<b>Atropine</b>	解除副交感神經、鎮痛、血壓增加、抑制腺體、抑制平滑肌收縮	皮膚發紅、呼吸脈搏增加、高溫乾燥、瞳孔放大	1mg/1ml Amp
<b>CaCl<sub>2</sub></b>	電解質補充劑/氯化鈣	高鈣血、增加毛地黃之毒性	複方
<b>Epinephrine (Bosmin)</b>	興奮交感神經之神經末梢、使小動脈收縮、增加血壓、支氣管擴張、止血	噁心嘔吐、呼吸困難、蒼白、動悸、眩暈、頭痛	1mg/1ml Amp
<b>Glucose 50%</b>	高濃度葡萄糖	注射之後，有時可能誘發輕度的惡寒顫慄或發燒	20ml Amp
<b>Midazolam</b>	麻醉鎮靜劑	白天昏睡、情感麻木、警覺性降低、意識混亂、疲倦、暈眩、肌肉無力、運動失調、複視。	5mg/1ml Amp