

藥名 (口服藥)	類別	作用	副作用	機轉
ACETAMINOPHAN	<u>非麻醉性止痛藥</u>	解熱：對於體溫升高，並不採取抑制的方式，而以流汗的方式達到散熱、降體溫的效果，而這種藥對於正常體溫並沒有影響，並不會影響其恆溫的狀態。 鎮痛： 由於它能迅速地被腸胃吸收，並與血漿白結合，而產生效用，但是也很容易被排泄出體外，因此治療輕至中度的疼痛效果較佳，它最主要是以抑制大腦因興奮而引起的痛覺，對 CNS 產生有選擇性的止痛作用。 本適合對 Aspirin 過敏之患者，因為在同一劑量濃度下，兩者的效果是十分接近的。	(1)過敏症、偶有血小板減少症，應停止用藥。 (2)用藥期間，偶有噁心、嘔吐、食慾不振等症。 (3)有肝腎障礙等疾病的相關患者，要慎重給藥。	作用在中樞神經系統，抑制從下視丘體溫控制中樞傳出的交感神經衝動，以排汗方式降低體溫；提高疼痛閾值，減少痛覺的敏感性。
Antibiophilus 250mg/Cap	<u>益生菌</u>	暫時緩解輕度腹瀉、腹痛及便秘、整腸(調整排便)、軟便	-	Lactobacillus casei 與人體是一種共生關係，為腸道中的一種益菌。
Allermin CHLORPHENIRAMINE MALEATE	<u>末梢神經系統用藥</u> ／ <u>抗組織胺劑</u>	蕁麻疹、皮膚搔症、血清病、藥物過敏、過敏性鼻炎。	可能會有口乾、心跳加快、失眠、胃口降低等症狀。	與組織胺在 H <sub>1</sub> 受體產生競爭性的阻斷作用；同時具有抗膽鹼激性和鎮靜作用
B-COMPLEX	<u>維他命劑</u> ／ <u>水溶性維他命複方</u>	補充維他命 B 群，治療腳氣病、神經炎、舌炎、口角炎、癩皮病	-	促進人體代謝碳水化合物、脂肪、蛋白質，製造紅血球，執行許多氧化還原作用，有助神經與肌肉的運作功能。
Bethanechol BETHANECHOL CHLORIDE	<u>末梢神經系統用藥</u> ／ <u>副交感神經興奮劑</u>	急性手術後及分娩後功能性尿液滯留及神經性膀胱無力症	發汗、潮紅、流涎、腹部不適、下痢、頭痛、噁心、低血壓	興奮副交感神經，直接作用於突觸後受體，收縮逼尿肌以達到排尿的作用。
BIOFERMIN Biofermin	<u>消化劑</u>	整腸(消化不良)、腹瀉、便秘、腹部脹滿感。	-	1. 乳酸菌在腸內繁殖，能抑制有害菌之增殖。 2. 乳酸菌能使腸內菌叢正常，發揮顯著的整腸作用。

				3. 糖化菌能促進碳水化合物之消化，而提高乳酸菌之作用。
Cabergolin	<u>內分泌系統用藥</u> ／ <u>腦下垂體激素</u>	長效的多巴胺作用劑，抑制泌乳激素的分泌	Dopamine-2 受體的拮抗劑如止吐劑、抗高血壓劑、精神病用藥等會影響其作用。	本品為 dopaminergic ergoline 的衍生物，具有強力又長效抑制泌乳素的作用，它直接作用在腦下垂體的 D2-dopamine 接受體，。
Cytotec MISOPROSTOL	<u>消化系統用藥</u> ／ <u>胃黏膜保護製劑</u>	產科用法：可用於懷孕早期及中期的人工流產、懷孕晚期的引產及產後出血的預防與治療。 治胃及十二指腸潰瘍。	輕度或暫時性的噁心頭痛，頭昏，及腹部不適。 臨床： <b>體溫升高</b>	為人工合成的前列腺素 E1，具有促子宮頸成熟與刺激子宮收縮作用， 一般使用：活化壁細胞上 PGE 受體而減少胃酸分泌，且促進黏液細胞分泌弱鹼性黏液以保護胃黏膜。
Dexamethasone	<u>內分泌系統用藥</u> ／ <u>腎上腺皮質激素</u>	在醫療上有多種用途，它可當作消炎藥、如風濕性關節炎、痛風、皮膚發炎等等。它也可用來治療某些自身免疫性疾病、嚴重的支氣管氣喘(哮喘)。	青光眼、白內障、骨質疏鬆、精神異常、血壓升高、臉部及身體水腫等	為一種人工合成「皮質類固醇」藥物，具有免疫抑制及抗發炎。
ERGONOVINE Ergo	<u>麥角新鹼</u>	預防及治療因子宮力而引起之產後及流產後子宮出血。	1. 不得用於誘導生產以及緊迫性自然流產之病例。 <b>2. 高血壓。</b>	促進平滑肌收縮：血管及子宮收縮以達預防與治療子宮出血。
Flagyl METRONIDAZOLE	<u>婦科用藥</u>	阿米巴痢疾、阿米巴肝膿腫、陰道滴蟲感染所引起的陰道炎、白帶，以及對本要具有感受性之厭氣菌引發的感染。	<b>運動失調</b> 、虛弱、失眠、 <b>排尿困難</b> 、嘔吐、腹瀉、產生 <b>金屬味覺</b> 、舌苔、舌炎、陰道念珠菌增生、性交困難、可逆性嗜中性白血球減少症、痙攣性發作、周邊神經病變、尿失禁、骨盤壓迫感、直腸炎、眩暈、膀胱炎、頻尿、短暫性關節痛。	作用是經由厭氣性細菌代謝所獨有的機轉而使本藥在細胞內進行化學性還原反應。被還原後之本藥具有細胞毒，它可與 DNA 相互作用，導致螺旋結構的喪失、股的斷裂，其結果乃抑制核酸之合成，而使細胞死亡。
GM GENTAMYCIN SULFATE	<u>抗生素</u> ／ <u>胺基糖苷類</u>	本藥品為 AMICNGLYCOSIDE 系列的抗生素，對革蘭氏陽性、陰性菌、立克次氏體及巨型濾過性病毒感染症有效，也包含綠膿桿菌變形菌。注射劑適用於一般尿路或全身性之細菌感染。	耳、腎毒性、神經肌肉阻斷	為殺革蘭氏陰性的首選藥物。 對革蘭氏陽性、陰性菌、立克次氏體及巨型濾過性病毒感染症有效，也包含綠膿桿菌變形菌

Gowell	<u>消化系統用藥／消化性潰瘍治療劑</u>	<p>1 Scopolia Extract 具副交感神經抑制作用，對胃酸過多、胃痛、胃痙攣、胃、十二指腸潰瘍痙攣性便秘之消化液分泌抑制及鎮痙具有功效。</p> <p>2 Benzocain 乃強力之非水溶性局硬麻醉劑，無刺激性、毒性、副作用小，內服時對於胃炎、胃潰瘍等所引起之胃痛噁心、嘔吐頗有功效。</p> <p>3 Sodium Bicarbonate 具有速效而作用時間短暫之制酸作用，而 Magnesium Oxide 則具有遲效性而作用時間長久之制酸作用，兩者配合，可產生迅速而持久之制酸作用，同時不會促進胃液之二次分泌。</p> <p>4 本品口服後，可迅速發揮其緩解胃痛制酸、鎮吐等作用，同時作用時間長。</p>		<p>可以改變腸胃道中氣泡的表面張力，使氣泡凝聚在一起，進而促進氣泡的排出。因只有局部物理作用，不會干擾胃酸分泌。其中之一的藥物成分 Magnesium 為制酸劑，以化學反應的方式中和或緩衝已存在胃中的胃酸，但不直接影響胃酸的生成，這個作用能使胃中的 PH 值上升而緩解因胃酸過多所引起的症狀。</p>
Keflex CEPHALEXIN MONOHYDRATE	<u>抗生素／頭孢子菌素</u>	<p>抑制細菌細胞壁合成，為半合成廣效性第一代頭孢子菌素，對於抗 methicillin 葡萄球菌無效。</p> <p>感受性細菌所引起呼吸道、生殖泌尿道、皮膚和軟組織感染症。</p>	<p>休克、過敏症、淋巴結腫脹、關節痛、血小板減少、顆粒球減少、嗜伊紅性紅血球增多、<b>溶血性貧血、黃疸、腹痛、血便</b>的激烈性下痢、軟便、食慾不振、<b>vitK 缺乏症狀、vitB 缺乏症狀、頭痛、暈眩、全身倦怠感等。</b></p>	<p>感受性細菌所引起呼吸道、生殖泌尿道、皮膚和軟組織感染症</p>
Ibuprofen	<u>非類固醇類抗發炎藥</u>	<p>解熱、鎮痛、抗炎。</p>	<p>同非類固醇類抗發炎藥</p>	<p>同非類固醇類抗發炎藥</p>
MgO MAGNESIUM OXIDE	<u>消化系統用藥／制酸劑抗發脹劑</u>	<p>緩解酸度過高有關之胃症狀(胃灼熱，酸性消化不良)，胃和十二指腸潰瘍，回流性食道炎，便秘。</p>	<p>腹瀉，腹絞痛，噁心，高血鎂，長期使用可能發生腎結石</p>	<p>軟便:利用電解質滲透壓的原理, 刺激排便 制酸:利用酸鹼中和的原理, 中和胃酸</p>
Ponstan Mefenamic acid	<u>非類固醇類抗發炎藥</u>	<p>解熱、鎮痛、抗炎。</p>	<p>1. 常見-噁心，嘔吐，腹瀉；2. 偶有-消化不良，頭暈，貧血，血小板減少，白血球減少，心悸，呼吸困難，神經質，精神紊亂；3. 嚴重者-胃腸出血、顆粒性白血球缺乏症等。</p>	<p>抑制合成前列前素所需的 COX-1 及 COX-2 酵素，具有解熱鎮痛效果，並可有效對抗急、慢性的發炎反應。</p>

<b>Primperan</b> METOCLOPRAMIDE	<b>消化系統用藥／健胃消化劑利膽劑</b>	食慾不振、各種習慣性或神經性噁心、嘔吐、腹部膨脹感等消化機能異常症狀均有療效。	1. 疑似有嗜鉻細胞瘤之患者，為避免引起血壓急劇上升，勿服用本品 2. 小孩、老年人以及有腎障礙之患者請遵照醫師指示用藥。尤其是小孩服用本品容易出現錐體外徑症狀，須特別注意。	可刺激上消化道的運動，加速胃部及十二指腸排空，並抑制嘔吐中樞，減緩嘔吐症狀
<b>Transamine</b> TRANSAMINE	<b>血液系統用藥／止血劑</b>	1. 強力抗胞素(plasmin)的作用。 2. 抗過敏，抗炎作用。	噁心、胸內不適感、心悸、 <b>血壓下降</b> 。	纖維蛋白溶解現象(纖溶現象)是由於身體生理上及疾病狀態的纖維蛋白分解，血管通透性增加及體內 plasmin 作用所引起的各種出血性疾病及過敏的發生，Tranexamic acid 是抑制此 plasmin 作用的成分，顯示有止血、抗過敏、抗炎症的效果。
<b>Voren</b> DICLOFENAC SODIUM	<b>非類固醇抗發炎藥</b>	是一種非類固醇化合物，具有顯著的抗風濕、抗發炎、鎮痛及解熱作用，適用於發炎性和變形性風濕性疾病、非風濕性發炎性疼痛及開刀後疼痛、長效錠為特殊處方劑型使有效成份緩解慢慢釋出，以確保長時間的有效程度。	常見的為食慾不振、噁心、嘔吐、 <b>胃痛</b> 及下痢等之症狀。嚴重的可能會心跳不正常、休克、嚴重頭痛、出血等。	同非類固醇類抗發炎藥