

## 小兒科生命徵象之測量

2013.07.01 修訂

1、請參照基本護理技術手冊 3-2 體溫脈搏呼吸之測量、3-3

血壓的測量、3-4 疼痛指數評估。

X 7 表

2、特別注意事項：

1. TPR 正常值

年齡	心跳(次/分)			
	Awake Rate	Mean	Sleeping Rate	發燒/活動速率
新生兒~3 個月	85-205	140	80-160	>220
3 個月~2 歲	100-190	130	75-160	>200
2 歲~10 歲	60-140	80	60-90	>180
>10 歲	60-100	72	50-90	>180

核心體溫：36.7~37.8°C (NB除外)

年齡	呼吸(次/分)	血壓(mm/Hg)	
		收縮壓	舒張壓
新生兒	30-60	78-86	42-54
嬰兒(1-6 個月)	30-50	86-90	54-60
嬰兒(6-12 個月)	24-46	90-96	60-65
1-4 歲	20-30	96-99	65
4-6 歲	20-25	99-100	60-65
6-12 歲	16-20	100-115	60
>12 歲	12-13	100-115	60

SBP: 110+(Age x 2)  
70+(Age x 2)

2. 一般 注意事項

◇ 測量順序：R—>P—>T

◇ 興奮、哭、打嗝會使膚色、呼吸、脈搏發生改變。