

嬰兒室常規

1. 白班餵配方奶(milk)時間為 10:00AM 及 2:00PM，記錄餵奶時間為 10AM 及 2PM。如果是親餵(BF)則可 Call 媽媽來嬰兒室親餵，記錄親餵開始的時間。親子同室(rooming-in)記錄(蓋印)開始及返回嬰兒室的時間
2. 配方奶奶量之泡法: 出生 1~2 天 30c.c.，3~4 天 60c.c.，5 天 90c.c.。
3. 新生兒篩檢為出生第四天由大夜班學姐做。
4. TPR 測量時間為 1pm，測量順序為 R→P→T，PR(心尖脈)及 RR 需測足一分鐘；呼吸:40-60 次/分，脈搏 120-160 次/分，耳溫 36.5°C-37.5°C。2pm 後才可將 TPR 上傳(以 NIS 系統)。
5. 新生兒進入嬰兒室須放置保溫箱，30 分鐘後監測生命徵象及血氧(右上臂) SPO2 95%以上，注意 baby 情況若異常須通知學姐。
6. 新生兒出生後 NPO 4 小時，當生命徵象穩定且有尋乳表徵，才依其需求協助母乳哺餵。
7. 注意 24 小時內是否解胎大小便。若大小便顏色有異常時請留下尿布交給學姐，以利學姐交由醫師診視。
8. 任何時間發現新生兒手圈(雙手需戴手圈)不見，需通知老師或學姐，並即刻補上。(由老師或學姐核對資料正確後才能戴上)
9. 臍部護理:有臍夾者→由臍斷面至根部；無臍夾者→由根部至臍斷

面。先用 75% Alcohol 再用 95% Alcohol。

10. 臍夾於出生地**第三天**拔除。(出院一定要拔除臍夾)

11. B 型肝炎疫苗(第一劑)之接種時間:2000gm 以上，NSD 或 C/S 於出生 24 小時內。

12. 孕婦懷孕第 32 週做 B 肝檢查。如果媽媽 HbeAg(+)HbsAG(+)，嬰兒感染機率可能 90%，如為 HbeAg(-)、HbsAG(+)，嬰兒感染率可能 20%，建議 24 小時內注射免疫球蛋白可使感染機率降為 3%以下。